

にこにこ通信

12月号



インフルエンザの予防接種はお早めに！

インフルエンザに感染すると、風邪と同じようにのどの痛み、鼻汁、咳などの症状がみられる他、**38度以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛、全身倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。「インフルエンザ予防接種」は感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。2023年は例年よりも早く感染者が増加しているため、早めのワクチン接種をご検討ください。**

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時に接種可能です。また、それぞれのワクチンを別の日に接種する場合の接種間隔についても制限はありません。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

インフルエンザウイルスはどこから？



インフルエンザ予防接種について

- 例年12月から3月がインフルエンザの流行シーズン
- 2023年は10月頃から接種開始
- 接種回数



13歳以上	原則、1回接種
13歳未満	2回接種※

※年齢によって接種量が異なります

※ 年末年始診療のお知らせ ※

12月29日(金) 午前中 通常診療 / 午後 休診
 12月30日(土) 休診 12月31日(日) 休診
 1月1日(月) 休診 1月2日(火) 休診
 1日3日(水) 休診 1日4日(木) 通常診療

※救急の場合は、日曜・祝日も診察します



医療サービス委員会 : 清水